VERENIGING
WEIDEVOGELBESCHERMING
STAPHORSTERVELD E.O.

© VERENIGING
WEIDEVOGELBESCHERMING STAPHORSTERVELD E.O.

Resultaten en analyse weidevogelseizoen Staphorsterveld e.o. 2026

Zoekgebied

Het zoekgebied van de vereniging weidevogelbescherming Staphorsterveld e.o. bevindt zich tussen Hasselt - Lichtmis - Rouveen - Staphorst - Meppel – Zwartsluis (zie kaartje hiernaast) en is ongeveer 8.200 ha groot. In het gebied is een provinciaal weidevogelbeheergebied open grasland van 4.700 ha aangewezen, waarin een kerngebied van 1.200 ha. met als kritische doelsoorten wulp, grutto en tureluur. Het Staphorsterveld wordt gekenmerkt door een slagenlandschap met langgerekte percelen, met diverse smalle en brede sloten. De bodem bestaat uit een tot 2,5 meter dik veenpakket en is nog steeds één van de grootste bolwerken van de wulp in Noordwest Europa. In het Staphorsterveld ligt het 795 grote natura 2000 gebied de Olde Maten en de Veerslootlanden dat grotendeels in eigendom is van Staatsbosbeheer, met daarin een 250 ha groot weidevogelreservaat (150 ha ingericht voor weidevogels en 100 ha blauwgraslanden met een bloemrijke open vegetatie)



Locaties gevonden nesten in 2026

Op onderstaande kaarten zijn de locaties weergegeven van de gevonden nesten van grutto, kievit, scholekster, tureluur en wulp.

Grutto




Kievit



Scholekster



Tureluur




Wulp



Aantal gevonden nesten (met één of meer eieren)
In 2026 zijn 927 weidevogelnesten (met eieren) gevonden.
In tabel 1 het aantal gevonden nesten van de diverse vogels van de afgelopen 5 jaren.
In grafiek 1 het relatief aantal nesten van de 5 belangrijkste weidevogels uit dezelfde periode.

Tabel 1

jaar	grutto	kievit	scholekster	tureluur	wulp	wilde eend	slob eend	eend onbekend	graspieper	gelekwikst	watersnip	kleine plevier	Krakeend	Zomertaling	Knobbelzwaan	Waterhoen	Onbekend Soort	aantal nesten
2022	30	291	34	31	70	9	2	1		1								469
2023	44	266	29	30	62	8	3				1		2					445
2024	34	440	19	26	74	23	7	1				1	1					626
2025	74	540	32	34	73	13	1			1								768
2026	76	619	46	28	97	32	3		1			5	2	1	1	1	15	927



Uit tabel 1 en grafiek 1 blijkt dat in 2026 ten opzichte van 2025:

- het aantal gevonden gruttonesten met 2 nesten (2,7%) licht is toegenomen.
- het aantal gevonden kievitsnesten met 79 nesten (14,6%) is toegenomen.
- het aantal gevonden scholeksternesten met 14 nesten (43,8%) sterk is toegenomen.
- het aantal gevonden tureluurnesten met 6 nesten (-17,6%) is afgenomen.
- het aantal gevonden wulpennesten met 24 nesten (32,9%) sterk is toegenomen.
- Bij de overige vogelsoorten is eveneens een stijging zichtbaar. Vooral het aantal wilde eenden nam toe, van 13 naar 32 nesten (+146,2%). Daarnaast werden meer nesten gevonden van onder andere kleine plevier, slobeend, krakeend, graspieper, knobbelzwaan, waterhoen en zomertaling. Vanwege de relatief lage aantallen en het feit dat hier niet specifiek op wordt gezocht, worden deze soorten verder buiten beschouwing gelaten.

Statistiek invoermethode legsels
Een gevonden legsel kan ingevoerd worden via de telefoon of later thuis via de computer / laptop.
Wanneer een legsel is gevonden met de drone en later ingevoerd door de zoeker, dan wordt dat aangegeven als drone. Zie tabel 2

	2026		2025		2024		2023		2022	
Invoermethode	Aantal nest	%	Aantal nest	%	Aantal nest	%	Aantal nest	%	Aantal nest	%
Mobiel/Pc	536	57,8	472	61,2	497	79,2	419	94,2	469	100
Drone	391	42,2	299	38,8	131	20,8	26	5,8	0	
Aantal nesten	927	100	771	100	628	100	445	100	469	100

De drone nesten in 2025 (299) en 2026 (391) zijn is meer nesten dan vermeld in BLVM, omdat een aantal zoekers ter plekke een nieuw legsel aanmaakten i.p.v. dat het drone legsel werd overgenomen.

Het aantal met behulp van de drone opgespoorde nesten nam toe van 299 in 2025 naar 391 in 2026. Dat is een stijging van 92 nesten (+30,8%). Het aandeel van de drone in het totaal aantal gevonden nesten steeg van 38,8% naar 42,2%. De groei van het totaal aantal gevonden nesten in 2026 is daarmee voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de inzet van de drone, die opnieuw meer nesten wist op te sporen dan het jaar ervoor.

Aantal nesten per bedrijf
De bedrijven waar gezocht wordt verschillen in grote die varieert tussen 1 en meer dan 40 HA. In tabel 3 staan het aantal gevonden nesten per bedrijf (nesten) versus het aantal bedrijven .
Uit de tabel blijkt dat op 58 bedrijven 1-5 nesten zijn gevonden en dat op 1 bedrijf 61-65 nesten gevonden zijn.
(Bedrijf Courtz met 64 nesten en Bedrijf Hoeve en A. Hoeve-Coster, W. – 37 nesten. (er lagen 63 nesten van bedrijven Courtz en Hoeve in het gebiedsraster) Overige 38 nesten waren op de andere percelen van deze bedrijven!

Tabel 3: Aantal gevonden nesten versus aantal bedrijven.

aantal									
nesten	bedrijven	nesten	bedrijven	nesten	bedrijven	nesten	bedrijven	nesten	bedrijven
1-5	58	11-15	5	21-25	2	31-35	0	41-60	0
6-10	17	16-20	4	26-30	0	36-40	1	61-65	1

Resultaten gevonden nesten.
Er kan van alles met een nest gebeuren, nadat het gevonden is. Veel nesten gaan verloren als gevolg van predatie (rood). Ook kan het voorkomen dat een nest verloren gaat als gevolg van landwerkzaamheden (paars) of door een onbekende oorzaak (lila) of dat een nest verlaten wordt (bruin). Daarnaast komt het voor dat een gevonden nest niet kan worden teruggevonden, dit laatste komt nogal eens voor bij kievits- en tureluursnesten.

Op onderstaande kaarten staan de locaties van de nesten vermeld met hun bevindingen.
Voor de aantallen zie tabel 4.

Uit **Predatie** **Werkzaamheden** **Onbekend** **Verlaten**



Tabel 4

	nesten								
soort	Bekend resultaat[1)]	uit	% uit	gepredeerd	% predatie	verlaten	werkzaamheden / beweiding	onbekend [2)]	overig
grutto	70 (92,1%)	61	87,1	9	12,9				
kievit	556 (89,7%)	402	72,3	93	16,7	10	8	34	9
scholekster	42 (91,3%)	25	59,5	14	33,3			2	1
tureluur	25 (89,3%)	24	96,0	1	4,0				
wulp	93 (95,9%)	59	63,4	20	21,5	1	1	12	
totaal	786 (90,6)	571	72,6	137	17,4	11	9	48	10


[1)] dit zijn de nesten die na het vinden minimaal 1x zijn gecontroleerd. ( ) het % van de gevonden nesten.
[2)] Deze nesten zijn wel gecontroleerd. Bij de controle was het niet duidelijk wat er van het legsel is geworden.

Uit tabel 4 blijkt dat:

- Van 90,6% van de gevonden nesten het uiteindelijke resultaat bekend is. Dit percentage verschilt weinig tussen de verschillende vogelsoorten en is, vergeleken met voorgaande jaren, vooral bij de kievit en tureluur relatief hoog.
- Het gemiddelde percentage uitgekomen nesten bedraagt 72,6%. Dat is 11,6 procentpunt hoger dan in het voorgaande jaar, toen 61,0% van de nesten uitkwam.
- Bij de grutto kwam 87,1% van de nesten succesvol uit. Dit is duidelijk hoger dan in het vorige jaar (64,9%).
- Ook bij de kievit ligt het percentage uitgekomen nesten met 72,3% duidelijk hoger dan in voorgaande jaren. De percentages uitgekomen nesten van scholekster, tureluur en wulp zijn eveneens beduidend hoger dan die van het vorige jaar.
- Het gemiddelde percentage gepredeerde nesten bedraagt 17,4%. Dit is 3,2 procentpunt lager dan in het vorige jaar (20,6%). Van de onderzochte soorten had de scholekster met 33,3% het hoogste aandeel gepredeerde nesten, hoewel dit duidelijk lager is dan in het vorige jaar (45,2%).

Opvallend is het relatief hoge aandeel nesten met een onbekend resultaat bij de wulp (12,9%). Ondanks controle kon bij deze nesten niet worden vastgesteld wat het uiteindelijke lot van het legsel is geweest. Verder blijkt uit de tabel dat slechts een beperkt aantal nesten verloren is gegaan als gevolg van beweiding of werkzaamheden.

Grafiek 2: uitkomstpercentage nesten in de periode 2022 – 2026



Uit grafiek 2 blijkt dat het uitkomstpercentage van de scholekster dit jaar het laagst is en toch hoger ligt dan vorig jaar. De wulp volgt daarna. Ook de uitkomstpercentages van de grutto en de kievit liggen iets hoger dan in het voorgaande jaar.

Tijdstip van het vinden van een nest

Tabel 5 geeft de datum weer waarop per soort het eerste en het laatste nest van het broedseizoen is gevonden. Het eerste nest werd op 12 maart gevonden bij de kievit, gevolgd door de wulp op 18 maart. Opvallend is dat het eerste wulpennest op dezelfde datum en op hetzelfde perceel werd gevonden als in het voorgaande jaar. Dit was bovendien opnieuw het eerste gevonden wulpennest van Nederland. Het laatste nest van het seizoen werd op 18 juni gevonden bij de kievit.

Tabel 5

	1e nest	laatste nest
Grutto	3-apr	29-mei
Kievit	12-mrt	18-jun
Scholekster	31-mrt	14-jun
Tureluur	10-apr	11-jun
Wulp	18-mrt	29-mei

Kievit nest 12 Maart



Wulpen nest 18 Maart



Op 3 april 2026 – 63 legsels
Op 7 april 2026 – 54 legsels
Op 24 april 2026 – 46 legsels
Deze drie dagen werden de meeste nesten van het broedseizoen 2026 in Staphorsterveld gevonden.

Predatie en de predatoren

In tabel 6 staan de door de zoekers vastgestelde oorzaken van predatie van nesten weergegeven over de afgelopen vijf jaar. In 2026 is het predatiepercentage verder afgenomen van 24,76% in 2025 naar 15,97%. Ondanks dat er meer nesten zijn gevonden (927 tegenover 626 in 2025), bleef het aantal gepredeerde nesten nagenoeg gelijk (148 tegenover 155).

Opvallend in 2026 is dat er geen predatie door de vos is vastgesteld. Waar de vos in eerdere jaren één van de belangrijkste genoemde predatoren was, zijn in 2026 geen gevallen aan de vos toegeschreven. Dit betekent niet dat de vos niet aanwezig was, maar dat er geen nestverliezen zijn gevonden waarbij de vos als oorzaak is vastgesteld.

De meeste predatie werd in 2026 veroorzaakt door vogels (18 gevallen), gevolgd door steenmarter (6) en hermelijn/wezel (4). De daling van het predatiepercentage laat zien dat het aandeel verloren gegane nesten door predatie in 2026 lager was dan in voorgaande jaren.

Tabel 6

	2022	2023	2024	2025	2026	totaal
Onbekend	110	71	156	116	117	570
Vogels	17	12	16	21	18	84
Vos	25	45	17	3	0	90
Steenmarter	2	0	2	8	6	18
Hermelijn/Wezel	0	12	7	4	4	27
Bunzing	0	0	1	1	0	2
Overige dieren/mens	0	0	1	2	3	6
Totaal aantal Predatie	154	140	200	155	148	797
Aantal gevonden nesten	462	469	445	626	927	2929
% Predatie	33,33%	29,85%	44,94%	24,76%	15,97%	27,21%

Onbekende predatie

In 2026 werd bij 117 van de 148 gepredeerde nesten de oorzaak van het verlies als onbekend geregistreerd. Dit betekent dat **79,1% van alle vastgestelde predatiegevallen** niet aan een specifieke predator kon worden toegeschreven.

Predatie Bruine kiekendief





Cameraonderzoek

In kader van het steenmarteronderzoek zijn dit jaar 25 camera's geplaatst, 21 bij kievitsnesten en 4 bij een scholeksternest. Het onderzoek vond plaats in het gebied dat wordt omsloten door de Stadsweg, Afschuttingsweg, N377 en Holtrustweg . Uit het onderzoek blijkt dat de steenmarter 3 nesten heeft gepredeerd, gevolgd door de bruine kiekendief met 2 nesten, 1 met de marter en 1 zwarte kraai / kauw Zie tabel 8.

		Bevindingen			Predator				
	Aantal nest	Uit	Predatie	Verlaten	Marter	Steenmarter	zw. Kraai/kauw	Bruine kiekendief	Onbekend
Kievit	21	11	6	4	1	2	1	2	
Scholekster	4	2	2			1			1
Totaal	25	13	8	4	1	3	1	2	1
Totaal %	100	100%	32%	16%	13%	38%	13%	25%	13%













Rasteren van wulpennesten

In 2026 zijn voor 52 wulpennesten verzoeken gedaan om een beschermend raster te plaatsen. Uiteindelijk konden 39 nesten individueel worden gerasterd. Hiervan zijn 5 nesten succesvol beschermd met een tweede rasterpoging.
Bij 2 nesten bleek de wulp het raster niet te accepteren en bleef de vogel op het nest zitten, waardoor het raster uit dierenwelzijnsoverwegingen niet is geplaatst. *Tijdens de rasterwerkzaamheden is helaas per ongeluk op enkele wulpeneieren gestapt. Dit gebeurde doordat een vrijwilliger moeite had om het evenwicht te bewaren. Het betrof een ongelukkig voorval dat niet opzettelijk heeft plaatsgevonden.*

Een opvallend knelpunt was de hoge predatie vóór het raster kon worden geplaatst. Van de 52 rasterverzoeken gingen 10 nesten (19,23%) verloren voordat vrijwilligers de gelegenheid hadden om een raster te plaatsen. Regelmatig bleek een nest dat de ene dag werd gevonden, de volgende dag – wanneer het raster geplaatst zou worden – al te zijn gepredeerd. Dit laat zien hoe groot de predatiedruk in het gebied is en hoe belangrijk een snelle opvolging na het vinden van een nest is.
Van de 39 succesvol gerasterde nesten kwamen 34 nesten succesvol uit. Dat betekent een slagingspercentage van 87,18%. Dit bevestigt dat rasterbescherming een zeer effectieve maatregel is om wulpennesten tegen predatie te beschermen.
Wanneer alle 52 rasterverzoeken worden meegenomen, inclusief de nesten die al verloren gingen voordat een raster kon worden geplaatst, bedraagt het totale succes 65,38%. Dit lagere percentage wordt dus vooral veroorzaakt door de hoge predatie in de korte periode tussen het vinden van een nest en het daadwerkelijk plaatsen van een raster.


Resultaten van alle wulpennesten

In totaal werden in 2026 97 wulpennesten gevonden. Van 93 nesten is het uiteindelijke resultaat bekend; bij 4 nesten bleef de uitkomst onbekend.
Van de 93 nesten met een bekende uitkomst:

- 59 nesten (63,44%) kwamen succesvol uit.
- 34 nesten gingen verloren.

Wanneer de gerasterde nesten buiten beschouwing worden gelaten en ook de nesten die al vóór het rasteren werden gepredeerd niet worden meegeteld, blijven 41 niet-gerasterde nesten over. Hiervan kwamen 25 nesten succesvol uit, een uitkomstsucces van 60,98%.
Kijken we naar alle 54 nesten zonder rasterbescherming, dan bedraagt het uiteindelijke uitkomstpercentage 46,30%. Dit verschil onderstreept duidelijk de meerwaarde van rasterbescherming. De resultaten laten zien dat een goed geplaatst raster de kans op een succesvolle uitkomst aanzienlijk vergroot. Tegelijkertijd vormt de hoge predatie in de periode direct na het vinden van een nest een belangrijk aandachtspunt. Juist in deze eerste 24 uur gaan nog veel nesten verloren, waardoor een deel van de nesten nooit de kans krijgt om door rasterbescherming te profiteren.

Raster pogingen (verzoek tot rasteren)		52
Raster gelukt in 2 pogingen		5
Gerasterd individueel (gelukte pogingen)		39
Wulp accepteert raster niet (bleef zitten)		2
Gepredeerd voor rasteren plaats vond		10
Uitgekomen na gerasterd te zijn		34
Ongeluk bij rasteren		1
slagings percentage na rasteren		87,18%
percentage predatie net voor het rasteren		**19,23%**
slagingspercentage alle rasterpogingen/verzoeken (52)		65,38%



Totaal Wulp		
nesten		97
Resultaten nest bekend		93
onbekend resultaat		4
uitkomsten totaal		
uitgekomen		59
verloren		34
% uit totaal		63,44%
Nesten zonder raster en predatie voor rasteren		41
uitgekomen daarvan		25
succes		60,98%
Nesten zonder raster		54
Nesten zonder raster UIT%		46,30%

Vossen werend gebiedsraster

Twee gebieden, 1 in de Oosterslag ten noorden van de Conrad weg en 1 in de Zuideindigerslag ten zuiden van de Stadsweg zijn omgeven door een elektrische vossen werend gebiedsraster. Het gebiedsraster in de Oosterslag is 13 percelen groot met een oppervlakte van ongeveer 23 ha en dat in de Zuideindigerslag bestaat uit 1 perceel met een oppervlakte van 6,5 ha. De resultaten van het rasteren staan vermeld in tabel 10. De wulpennesten zijn hier buiten beschouwing gelaten. Uit de tabel blijkt dat het omrasteren van percelen zinvol is. Slechts 1 nest is gepredeerd, door een onbekende predator. Het aantal kievitsnesten met onbekende uitslag heeft te maken met het feit dat de nesten niet meer waren terug te vinden. Deze nesten kunnen zijn uitgekomen of gepredeerd.

	nesten							
soort	Bekend resultaat[1)]	uit	% uit	gepredeerd	% predatie	verlaten	werkzaamheden	onbekend
grutto	36	30	83,3	6	16,7	0	0	1
kievit	25	17	68	1	32	1	0	6
scholekster	0	0	0	0	0	0	0	0
tureluur	14	12	85,7	0	0	0	0	1
totaal	75	59	78,7	6	9,3	1	0	8

Nesten die verloren zijn gegaan tijdens werkzaamheden op het land

In 2026 zijn 7 (0,8%) van de gevonden nesten verloren gegaan als gevolg van werkzaamheden. Het betrof 6 kievitsnesten, waarvan 1 nest verloren ging door maaien, 2 nesten door mestwerkzaamheden, 1 nest door ploegen en 2 nesten door overige werkzaamheden. Daarnaast is 1 wulpennest verloren gegaan tijdens het rasteren.(zie uitleg* in Rasteren van wulpen nesten)




Beschermingsmaatregelen

Om verliezen tijdens werkzaamheden te voorkomen, kunnen beschermingsmaatregelen worden getroffen.


Door de zoekers is aangegeven dat bij 343 nesten 1 of meerdere beschermingsmaatregelen zijn genomen, zie overzicht 10. (PS. deze schijf is niet volledig, aangezien dat meerdere zoekers de beschermingsmaatregelen niet of onvolledig hebben genoteerd)

Overzicht 10



BTS telling

De BTS-telling wordt ingezet bij de beheermonitoring van weidevogels. De BTS-telling bestaat uit een broedparentelling en een gezinnentelling. De BTS-telling heeft vooral als doel inzicht te krijgen in het broedsucces van de grutto en de wulp. De broedparentelling wordt uitgevoerd vlak voor het uitkomen van de eerste grutto-eieren en de gezinnentelling vlak voor het vliegvlug worden van de eerste gruttokuikens. De BTS is de verhouding tussen de gezinnentelling en broedparentelling. De tellingen zijn verricht op respectievelijk 2 mei en 28 mei



Gebied Oosterslag; omsloten door Dekkersland, Klaas Kloosterweg, Conradsweg, Rechterensweg

jaar	grutto			wulp		
	Oosterslag			Oosterslag		
	broedparen	gezinnen	BTS	broedparen	gezinnen	BTS
2022	24	35	145,8	13	9	69,2
2023	33	15	45,5	12	3	25,0
2024	17,5	14	80,0	12	1	8,3
2025	24	24	100	8,5	6,0	70,6
2026	46	44	95,7	16	13	81,2

Er wordt gesteld dat een minimale BTS van 60% bij de grutto en 40% bij de wulp nodig is om de populaties in stand te houden. Voor beide soorten is de BTS telling in 2026 meer dan voldoende gebleken.

Vliegvlugge kuikens

Wulp

In totaal zijn in 2026 97 wulpennesten gevonden. Geschat wordt dat hieruit 46 kuikens vliegvlug zijn geworden. Dat komt neer op gemiddeld 0,47 kuiken per gevonden nest (afgerond 0,5 kuiken per nest). Voor het in stand houden van de wulpenpopulatie is minimaal 0,4 kuiken per nest nodig.

Grutto

In totaal zijn in 2026 76 gruttonesten gevonden. Geschat wordt dat hieruit 30 kuikens vliegvlug zijn geworden. Per gevonden gruttonest is dat gemiddeld ongeveer 0,4 kuiken per nest. Voor het in stand houden van de gruttopopulatie is minimaal 0,6 kuiken per nest nodig.





Analyse Veerslootlanden en Staatsbosbeheer.

https://www.anvhorstenmaten.nl/wp-content/uploads/2026/10/Rapportage-weidevogels-VSL-OM-2017-2026_Bunskoek-Natuurlijk_concept_v080926.pdf

Terugblik op het weidevogelseizoen 2026

Het weidevogelseizoen van 2026 kan voor het Staphorsterveld en omgeving als een goed en bijzonder seizoen worden beschouwd. In totaal werden 927 nesten van weide- en akkervogels gevonden, het hoogste aantal van de afgelopen vijf jaar. Vooral het aantal gevonden kievits-, scholekster- en wulpennesten nam duidelijk toe ten opzichte van 2025. Ook het aantal met behulp van de drone opgespoorde nesten steeg opnieuw aanzienlijk, waardoor nesten eerder werden ontdekt en beter konden worden beschermd.

Het voorjaar begon relatief gunstig voor de broedvogels. De eerste nesten werden al vroeg gevonden en gedurende het seizoen waren de weersomstandigheden over het algemeen gunstig. Langdurige natte perioden of extreme weersomstandigheden, die in andere jaren regelmatig voor problemen zorgen, bleven grotendeels uit. Hierdoor verliep het broedseizoen rustig en konden veel vogels hun legsel succesvol uitbroeden.

Ook de landbouw speelde dit jaar een belangrijke rol in het uiteindelijke broedsucces. De eerste snede gras werd niet overal tegelijk gemaaid, maar verspreid over meerdere weken. Door verschillen in bodemgesteldheid, draagkracht en bedrijfsvoering begonnen sommige veehouders al vroeg met maaien, terwijl andere bedrijven pas veel later aan hun eerste snede toekwamen. Hierdoor ontstond een gunstige spreiding in de werkzaamheden. Op het moment dat de eerste bedrijven al bezig waren met de tweede snede, moesten andere bedrijven hun eerste snede nog maaien.

Deze gefaseerde werkwijze had een duidelijk voordeel voor de weidevogels. Kuikens konden zich verplaatsen naar percelen waar het gras nog niet was gemaaid en vonden daar beschutting en voedsel. Daardoor bleef gedurende een langere periode geschikt kuikenland aanwezig. Deze spreiding in de werkzaamheden heeft naar verwachting positief bijgedragen aan de overlevingskansen van veel kuikens.

Daarnaast was de samenwerking met de agrariërs opnieuw uitstekend. Vrijwel alle gevonden nesten konden tijdig worden gemarkeerd of op een andere manier worden beschermd, waardoor slechts een zeer klein aantal nesten verloren ging als gevolg van landwerkzaamheden. Van de 927 gevonden nesten gingen slechts 7 nesten (0,8%) verloren door werkzaamheden op het land. Dit onderstreept de betrokkenheid van de deelnemende agrariërs en loonwerkers bij de bescherming van de weidevogels.

Ook de predatiecijfers laten een positieve ontwikkeling zien. Hoewel in totaal 148 nesten verloren gingen door predatie, komt dit neer op 15,97% van alle gevonden nesten. Dit is het laagste predatiepercentage van de afgelopen vijf jaar. Opvallend was bovendien dat geen enkel nestverlies met zekerheid aan de vos kon worden toegeschreven. Bij een groot deel van de predatiegevallen bleef de veroorzaker echter onbekend, waardoor de precieze invloed van verschillende predatoren moeilijk vast te stellen is.

Daarnaast werden in het gebied meerdere broedparen van verschillende uilensoorten waargenomen. Dit kan erop wijzen dat er voldoende voedsel en geschikte leefomstandigheden aanwezig zijn. Uilen zijn afhankelijk van een gevarieerd voedselaanbod, waaronder muizen, insecten en, afhankelijk van de soort, kikkers en andere kleine dieren. Een gezond voedselaanbod draagt bij aan een evenwichtig ecosysteem. Wanneer er voldoende alternatieve prooien beschikbaar zijn, kan dit mogelijk de predatiedruk op weidevogels verminderen. De aanwezigheid van meerdere broedparen van uilen is dan ook een interessante waarneming binnen het gebied. Wel blijft het belangrijk om te beseffen dat uilen zelf ook eieren en jonge vogels kunnen prederen. De daadwerkelijke invloed op het verlies van weidevogelnesten is daarom afhankelijk van de aanwezige soorten en de plaatselijke omstandigheden.

Bijzonder succesvol was opnieuw het beschermen van wulpennesten met rasters. Van de succesvol gerasterde nesten kwam ruim 87% uit. Wel bleek de periode tussen het vinden van een nest en het plaatsen van een raster een kwetsbaar moment. Bij bijna één op de vijf rasterverzoeken was het nest al gepredeerd voordat vrijwilligers het raster konden plaatsen. Dit laat zien dat juist snelheid bij het rasteren van groot belang blijft.

De resultaten laten uiteindelijk zien dat de genomen beschermingsmaatregelen effect hebben. De combinatie van intensief zoeken, de inzet van drones, goede samenwerking met agrariërs, beschermingsmaatregelen zoals het markeren en rasteren van nesten en de spreiding van de maaiwerkzaamheden heeft ertoe geleid dat het uitkomstpercentage van de nesten duidelijk hoger lag dan in voorgaande jaren. Vooral voor de kievit, grutto, scholekster en wulp was sprake van een duidelijke verbetering van het broedsucces.

Ondanks deze positieve resultaten blijven er aandachtspunten. Predatie blijft de belangrijkste oorzaak van nestverlies en vooral de hoge predatie in de eerste dagen na het vinden van een wulpennest vraagt om een nog snellere inzet van beschermingsmaatregelen. Wanneer deze ontwikkeling kan worden verbeterd en de goede samenwerking met de agrariërs wordt voortgezet, biedt dat goede perspectieven voor een verdere verbetering van het broedsucces van de weidevogels in het Staphorsterveld.

Link naar kievit beschermkooien: https://youtu.be/T2XpmM--pi4?si=7tPBpEIkoLNzAiNz
Link naar analyse film verslag: https://youtu.be/-DIS2WHpYbE?si=7hAzy_KzwEk-A9Od